

Informativni list o pasivnoj imunizaciji protiv RSV-a pomoću vakcine Beyfortusom

RSV, respiratorni sincicijski virus, je čest i rasprostranjen respiratorni virus. Po pravilu RSV infekcija prouzrokuje samo blage simptome, slične običnoj prehladi. Posebno kod dojenčadi, kod osetljive dece i starijih odraslih osoba, infekcija RSV-om može da prouzrokuje ozbiljne bolesti, uključujući bronhiolitis (upala malih disajnih puteva u plućima) i upalu pluća, što može dovesti do hospitalizacije ili čak smrti. Kod dece RSV infekcija je najčešći razlog hospitalizacije u zimskim mesecima. Virus se obično pojavljuje između oktobra i marta. Za zaštitu od RSV-a za novorođenčad, dojenčad i malu decu dostupan je Beyfortus.

Šta je Beyfortus (sastojak vakcine Nirsevimab)?

Za razliku od vakcinacije (aktivne imunizacije), kod koje antitela prvo mora proizvesti imunološki sistem, Beyfortus daje gotova antitela (pasivna imunizacija). Ta se antitela vežu za specifične delove virusa i sprečavaju virus da uđe u ljudske ćelije i time izazove simptome bolesti.

Ko bi trebao dobiti pasivnu imunizaciju?

Prema austrijskom planu vakcinacije, pasivna imunizacija uopšteno se preporučuje za novorođenčad, dojenčad i malu decu tokom prve sezone RSV-a, a posebno za visokorizičnu decu do 24 meseca starosti koja tokom druge sezone RSV-a ostaju i nadalje podložna teškom obliku RSV bolesti.

Kada se vrši pasivna imunizacija?

Deca rođena u toku sezone RSV-a između 1. oktobra i 31. marta trebaju da prime imunizaciju unutar prve nedelje života pre otpuštanja iz bolnice. Deca rođena izvan sezone RSV-a između 1. aprila i 30. septembra treba da prime imunizaciju pre prve sezone RSV-a putem lokalnih registriranih lekara za vakcinaciju.

Kako se izvodi pasivna imunizacija?

Beyfortus se daje kao jedna injekcija u mišić. Injekcija se obično daje u spoljašnju oblast butine.

Da li je pasivna imunizacija povezana sa troškovima?

Ne. Dostupna je besplatno kao deo besplatnog programa vakcinacije dece, programa savezne vlade, saveznih država i socijalnog osiguranja.

Da li postoje osobe koje ne bi trebale da prime pasivnu imunizaciju?

Pasivna imunizacija ne bi trebalo da se obavlja ako je Vaše dete alergično na nirsevimab ili neki drugi sastojak leka (vidi Informacije o korišćenju). Razgovarajte sa svojim lekarom da li vaše dete sme da primi Beyfortus ili ne.

Koje su nuspojave moguće?

Kao i svi lekovi, ovaj lek može prouzrokovati nuspojave iako ih ne dobijaju svi. Manje česte nuspojave (mogu se pojaviti kod 1 do 100 osoba) i ispoljavaju se kao:

- Osip (0,7%) unutar 14 dana nakon primene
- Reakcija na mestu uboda (0,6%), kao što su npr. crvenilo, otok i bol
- Povišena telesna temperatura (0,4 %)

Ovaj informativni list ne može zameniti Informacije o korišćenju ili informativni razgovor. Ako imate dodatnih pitanja o ovom leku, obratite se svojoj lekarki ili svom lekaru!