

Informativni list o pasivnoj imunizaciji protiv RSV-a pomoću cjepiva Beyfortusom

RSV, respiratorni sincicijski virus, je čest i rasprostranjen respiratorni virus. U pravilu RSV infekcija uzrokuje samo blage simptome, slične običnoj prehladi. Osobito u dojenčadi, kod osjetljive djece i starijih odraslih osoba, infekcija RSV-om može uzrokovati ozbiljne bolesti, uključujući bronhiolitis (upala malih dišnih putova u plućima) i upalu pluća, što može dovesti do hospitalizacije ili čak smrti. Kod djece je RSV infekcija najčešći razlog hospitalizacije u zimskim mjesecima. Virus se obično pojavljuje između listopada i ožujka. Za zaštitu od RSV-a za novorođenčad, dojenčad i malu djecu dostupan je Beyfortus.

Što je Beyfortus (djelatna tvar Nirsevimab)?

Za razliku od cijepljenja (aktivne imunizacije), kod koje antitijela najprije mora proizvesti imunološki sustav, Beyfortus daje gotova antitijela (pasivna imunizacija). Ta se protutijela vežu za specifične dijelove virusa i sprječavaju virus da uđe u ljudske stanice i time izazove simptome bolesti.

Tko bi trebao dobiti pasivnu imunizaciju?

Prema austrijskom planu cijepljenja, pasivna imunizacija općenito se preporučuje za novorođenčad, dojenčad i malu djecu tijekom prve sezone RSV-a, a posebno za visokorizičnu djecu do 24 mjeseca starosti koja tijekom druge sezone RSV-a ostaju i nadalje podložna teškom obliku RSV bolesti.

Kada se provodi pasivna imunizacija?

Djeca rođena tijekom sezone RSV-a između 1. listopada i 31. ožujka trebaju primiti imunizaciju unutar prvog tjedna života prije otpusta iz bolnice. Djeca rođena izvan sezone RSV-a između 1. travnja i 30. rujna trebaju primiti imunizaciju prije prve sezone RSV-a putem lokalnih za cijepljenje registriranih liječnika.

Kako se provodi pasivna imunizacija?

Beyfortus se daje kao jedna injekcija u mišić. Injekcija se obično daje u vanjsko područje bedra.

Je li pasivna imunizacija povezana s troškovima?

Ne. Dostupna je besplatno kao dio besplatnog programa cijepljenja djece, programa savezne vlade, saveznih država i socijalnog osiguranja.

Postoje li osobe koje se ne bi trebale pasivno imunizirati?

Pasivna imunizacija se ne bi smjela provoditi ako je Vaše dijete alergično na nirsevimab ili neki drugi sastojak lijeka (vidjeti upute za uporabu). Razgovarajte sa svojim liječnikom može li Vaše dijete primiti Beyfortus ili ne.

Koje su nuspojave moguće?

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svih. Manje česte nuspojave (mogu se pojaviti u 1 do 100 osoba) i očituju se kao:

- osip (0,7%) unutar 14 dana nakon primjene
- reakcija na mjestu uboda (0,6%), kao što su npr. crvenilo, otok i bol
- povišena tjelesna temperatura (0,4 %)

Ovaj informativni list ne može zamijeniti upute za uporabu ili informativni razgovor. Ako imate dodatnih pitanja o ovom lijeku, obratite se svojoj liječnici ili svojem liječniku!