

Az RSV elleni, Beyfortus-szal történő passzív immunizálásról szóló tájékoztató

Az RSV (respiratorikus szinciciális vírus) egy világszerte elterjedt légúti vírus. Az RSV-fertőzés általában csak enyhe, a közönséges megfázáshoz hasonló tüneteket okoz, azonban csecsemőknél, betegsége hajlamos gyermekeknél és idősebb felnőtteknél súlyos betegséghez is vezethet, ideértve a broncholitist (a tüdő hörgőcskéinek gyulladása) és a tüdőgyulladást, amely kórházi kezeléshez vagy akár halálhoz is vezethet. A téli hónapokban a gyermekek RSV-fertőzés miatt kerülnek kórházba. A vírus általában október és március között aktív. Újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek számára a Beyfortus biztosít védelmet az RSV ellen.

Mi a Beyfortus (hatóanyag: Nirsevimab)?

Az oltással (aktív immunizálással) szemben – amely során az antitesteket először az immunrendszernek kell előállítania – a Beyfortus kész antitesteket juttat be a szervezetbe (passzív immunizálás). Ezek az antitestek rátapadnak a vírusra, és megakadályozzák, hogy behatoljon az emberi sejtekbe, és ezáltal kiváltsa a betegség tüneteit.

Kinek ajánlott a passzív immunizálás?

Az osztrák oltási program szerint a passzív immunizálás az újszülöttek, a csecsemők és a kisgyermekek számára ajánlott az első RSV-szezonban, valamint kifejezetten a nagy kockázatnak kitett gyermekek számára 24 hónapos korig, akik a második RSV-szezonban is hajlamosak a súlyos RSV-betegsége.

Mikor kell elvégezni a passzív immunizálást?

Az október 1. és március 31. közötti RSV-szezonban született gyermekeknek életük első hetében, a kórházból való elbocsátás előtt kell átvenniük az immunizálást. Az április 1. és szeptember 30. között, az RSV-szezonon kívül született gyermekeknek az első RSV-szezon előtt kell átvenniük az immunizálást a házi orvosnál.

Hogy történik a passzív immunizálás?

A Beyfortust egyszeri injekció formájában, izomba adják be általában a comb külső területén.

Van a passzív immunizálásnak anyagi vonzata?

Nincs. A szövetségi kormány, a szövetségi tartományok és a társadalombiztosítás ingyenes gyermekoltási programjának keretében díjmentesen elérhető.

Van olyan eset, amikor nem ajánlott a passzív immunizálás?

A passzív immunizálás nem végezhető el, ha gyermek allergiás a nirsevimabra vagy a gyógyászati készítmény bármely más összetevőjére (lásd a használati utasítást). Ha szeretné megtudni, hogy gyermeke kaphat-e Beyfortust vagy sem, konzultáljon a gyermek kezelőorvosával.

Mik a lehetséges mellékhatások?

Mint minden gyógyászati készítménynek, így a Beyfortusnak is lehetnek mellékhatásai, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Az esetleges mellékhatások (100 betegből legfeljebb 1-nél jelentkeznek) az alábbiak lehetnek:

- Bőrkiütés (0,7%) a beadást követő 14 napon belül
- A beadás helyén fellépő reakció (0,6%), például bőrpír, duzzanat és fájdalom
- Láz (0,4%)

Ez a tájékoztató nem helyettesíti a használati utasítást és a konzultációt. Ha további kérdései vannak a gyógyászati készítménnyel kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához!