



# برگه اطلاعات در زمینه ایمن ی غی فعال در برابر RSV با استفاده از Beyfortus

ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) یک ویروس تنفسی رایج است. عفونت RSV خفیف مشابه علائم سرماخوردگی می‌شود. اما، در میان نوزادان، کودکان آسیب‌پذیر و به خصوص سالمندان، عفونت RSV می‌تواند باعث بروز بیماری‌های جدی شود، شامل برونشیت (عفونت مجاری تنفسی کوچک در ریه‌ها) و ذات‌الریه، که ممکن است منجر به بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ شود. در میان کودکان، عفونت RSV شایع‌ترین علت بستری شدن در طی ماه‌های زمستان است.  Beyfortus به عنوان یک محافظ در برابر RSV برای نوزادان تازه متولد شده، نوزادان و کودکان کوچک در دسترس است.

## Beyfortus چیست (ماده تشکیل‌دهنده فعال: nirsevimab)؟

بر خلاف یک واکسیناسیون (ایمن‌سازی فعال)، که در آن آنتی‌بادی‌ها باید توسط یک دستگاه ایمنی تولید شوند، آنتی‌بادی‌های از پیش تشکیل شده در Beyfortus ارائه می‌شود (ایمن‌سازی غیرفعال). این آنتی‌بادی‌ها به نقاط خاصی از ویروس متصل می‌شوند و از ورود ویروس به سلول‌های بدن و ایجاد علائم بیماری جلوگیری می‌کنند.

## چه کسی باید ایمن‌سازی غیرفعال دریافت نماید؟

بر اساس طرح واکسیناسیون اتریش، ایمن  کوچک در طی اولین فصل RSV توصیه می‌شود، و به طور خاص برای کودکان دچار ریسک بالا در گروه سنی تا 24 ماه توصیه می‌شود که هنوز نسبت به عفونت جدی RSV در طی فصل دوم RSV آسیب‌پذیر هستند.

## ایمن‌سازی غیرفعال باید چه زمانی رخ دهد؟

کودکانی که در طی فصل RSV متولد می‌شوند یعنی بین 1 اکتبر تا 31 مارس، باید در طی هفته اول تولد خود و قبل از مرخص شدن از بیمارستان ایمن‌سازی شوند. کودکانی که در خارج از فصل RSV بین 1 آوریل و 30 سپتامبر متولد می‌شوند باید قبل از اولین فصل RSV خود نزد یک پزشک ثبت شده مربوطه ایمن‌سازی شوند.

ایمن‌سازی غیرفعال چگونه ارائه می‌شود؟

Beyfortus به عنوان یک تزریق مجزا به ماهیچه ارائه می‌شود. این تزریق در عضله تراپچ انجام می‌شود.

آیا ایمن‌سازی غیرفعال هزینه‌ای در بر دارد؟

خیر، به طور رایگان به عنوان بخشی از برنامه واکسیناسیون کودکان تحت مدیریت دولت فدرال، لاندز فدرال و ارائه‌دهندگان بیمه اجتماعی در دسترس است.

آیا افراد خاصی هستند که باید ایمن‌سازی غیرفعال دریافت نمایند؟

در صورتی که کودک شما نسبت به nirsevimab یا هر ماده تشکیل‌دهنده محصول دارویی آلرژی دارد نباید برای او از ایمن‌سازی غیرفعال استفاده نمود (به برگه اطلاعات بیمار مراجعه نمایید). طبقاً به بلوک‌بندیها یک آیا می‌توان برای کودک شما Beyfortus تجویز نمود مشورت نمایید.

عوارض جانبی نامطلوب بالقوه کدامند؟

همانند تمام محصولات دارویی دیگر، این محصول دارویی ممکن است واکنش‌های نامطلوبی به همراه داشته باشد، اما همه افراد دچار این واکنش‌ها نمی‌شوند. واکنش‌های نامطلوب که گاهی رخ می‌دهد (و می‌تواند تا 1 نفر از هر 100 نفر را دچار کند) ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- راش (0.7%) طی 14 روز مصرف
- یک واکنش در موضع تزریق (0.6%)، از قبیل سرخی، ورم و درد
- تب (0.4%)

این برگه اطلاعات جایگزین برگه اطلاعات بیمار یا یک مشاوره رضایت آگاهانه نمی‌شود. در صورتی که سؤال دیگری درباره این محصول دارویی در ایستگاه بلوک‌بندی خنثی‌یاب‌گید.