

# Інформаційно-документаційний лист про пасивну імунізацію проти РСВ вакциною Бейфортус

РСВ, респіраторно-синцитіальний вірус, є широко розповсюдженим респіраторним вірусом. Як правило, РСВ-інфекція викликає лише легкі симптоми, схожі на звичайну застуду. Однак, особливо у немовлят, вразливих дітей та людей похилого віку, РСВ-інфекція може викликати важкі захворювання, включаючи бронхіоліт (запалення дрібних дихальних шляхів у легенях) та пневмонію, що може призвести до госпіталізації або навіть смерті. У дітей РСВ-інфекція є найпоширенішою причиною госпіталізації взимку. Вірус зазвичай виникає в період з жовтня по березень. Для захисту новонароджених, немовлят та дітей раннього віку від РСВ існує вакцина Бейфортус.

## Що таке Бейфортус (діюча речовина нірсевімаб)?

На відміну від вакцинації (активна імунізація), де антитіла спочатку повинні бути вироблені імунною системою, Бейфортус вводить готові антитіла (пасивна імунізація). Ці антитіла зв'язуються зі специфічними ділянками вірусу і запобігають проникненню вірусу в клітини людини і, таким чином, появі симптомів захворювання.

## Кому слід робити пасивну імунізацію?

Згідно з австрійським календарем щеплень, пасивна імунізація, як правило, рекомендується новонародженим, немовлятам і дітям молодшого віку під час першого сезону РСВ, а також дітям із групи ризику до 24 місяців, які залишаються вразливими до тяжкого перебігу РСВ під час другого сезону РСВ.

## Коли слід проводити пасивну імунізацію?

Діти, народжені в сезон РСВ у період з 1 жовтня по 31 березня, повинні отримати щеплення протягом першого тижня життя перед випискою з пологового будинку. Діти, народжені поза сезоном РСВ у період з 1 квітня по 30 вересня, повинні отримати імунізацію до першого сезону РСВ у суспільстві.

**Як здійснюється пасивна імунізація?**

Бейфортус вводиться у вигляді одноразової ін'єкції у м'яз. Зазвичай ін'єкцію роблять у зовнішню частину стегна.

**Чи потребує пасивна імунізація певних витрат?**

Ні. Вона доступна безкоштовно в рамках програми безкоштовних дитячих щеплень федерального уряду, федеральних земель і соціального страхування.

**Чи є люди, яким не слід проводити пасивну імунізацію?**

Пасивну імунізацію не слід проводити, якщо у вашої дитини є алергія на нірсевімаб або будь-який інший компонент препарату (див. також інструкцію з медичного застосування). Будь ласка, обговоріть із лікарем, чи можна вашій дитині робити щеплення вакциною Бейфортус.

**Які можуть виникнути побічні ефекти?**

Як і всі ліки, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не у всіх. Випадкові побічні ефекти (можуть вражати до 1 з 100 осіб, яким роблять щеплення) можуть бути такими:

- Шкірний висип (0,7%) протягом 14 днів після введення препарату
- Реакція в місці ін'єкції (0,6%), наприклад, почервоніння, набряк та біль
- Лихоманка (0,4 %)

Цей інформаційний лист не замінює інструкцію з медичного застосування та консультацію з лікарем. Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо цього лікарського засобу, будь ласка, зверніться до Вашого сімейного лікаря!