

Beyfortus ile RSV'ye karşı pasif aşılama hakkında bilgi formu

RSV, yani solunum sinsityal virüsü, yaygın olarak görülen bir solunum yolu virüsüdür. Genel olarak RSV enfeksiyonu soğuk algınlığına benzer şekilde sadece hafif semptomlara yol açar. Fakat özellikle bebeklerde, hassas çocuklarda ve yaşı ilerlemiş yetişkinlerde RSV enfeksiyonu bronşiolit (akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihaplanması) ve zatürre gibi ciddi hastalıklara yol açabilir ve bu da hastaneye yatışa ve hatta ölüme bile neden olabilir. Çocuklarda kış aylarında hastaneye yatışın en sık nedeni RSV enfeksiyonudur. Virüs normalde Ekim ve Mart ayları arasında ortaya çıkar. Beyfortus yeni doğanlar, bebekler ve küçük çocuklar için RSV'ye karşı koruyucu amaçla sunulmaktadır.

Beyfortus (etken maddesi nirsevimab) nedir?

Beyfortus'ta, antikoların önce bağışıklık sistemi tarafından üretilmesi gereken bir aşı uygulamasının (aktif aşılama) aksine, hazır antikolar (pasif aşılama) uygulanır. Bu antikolar virüsün belirli bölgelerine bağlanarak virüsün insan hücrelerine yayılmasını ve böylelikle hastalık semptomlarını tetiklemesini önler.

Pasif aşılama kimlere uygulanmalıdır?

Avusturya'nın aşı takvimi uyarınca, pasif aşılama genel olarak ilk RSV sezonunda yeni doğanlar, bebekler ve küçük çocuklar için ve özellikle ikinci RSV sezonunda ciddi RSV hastalığına duyarlı kalan 24 aya kadar olan yüksek risk altındaki çocuklar için önerilmektedir.

Pasif aşılama ne zaman uygulanmalıdır?

RSV sezonunda 1 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında doğan çocuklar, hastaneden taburcu edilmeden önce ilk haftaları içinde aşılanmalıdır. RSV sezonu dışında 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında doğan çocuklar, ikamet ettikleri bölgede ilk RSV sezonundan önce aşılanmalıdır.

Pasif aşılama nasıl uygulanıyor?

Beyfortus kas içine tek bir enjeksiyon şeklinde uygulanıyor. Genel olarak enjeksiyon uyluğun dış bölgesine yapılır.

Aşılma ücretli mi?

Hayır. Federal hükümetin, eyaletlerin ve sosyal sigortaların ücretsiz çocuk aşısı programının bir parçası olarak ücretsiz şekilde sunulmaktadır.

Pasif aşı uygulanması gereken kişiler var mı?

Çocuğunuzda nirsevimab veya ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerji söz konusuysa pasif aşılanma uygulanmamalıdır (ayrıca kullanım talimatlarına bakın). Lütfen çocuğunuza Beyfortus uygulanıp uygulanamayacağını doktorunuzla görüşün.

Ne tür yan etkiler oluşabilir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilaçta da yan etkilere görülebilir, ancak bunlar herkeste görülmez. Bazen görülen yan etkilerin (tedavi edilen her 100 kişiden 1'inde görülebilir) arasında aşağıdaki etkiler yer alabilir:

- Uygulama yapıldıktan sonraki 14 gün içinde deri döküntüsü (%0,7)
- Enjeksiyon yerinde örneğin kızarıklık, şişme ve ağrı gibi reaksiyonlar (%0,6)
- Ateş (%0,4)

Bu bilgi formu, kullanım talimatlarının ve bir bilgilendirme görüşmesinin yerini tutamaz. Bu ilaç hakkında başka sorularınız varsa, lütfen tedaviyi uygulayan doktorunuzla iletişime geçin!