

Информационный листок о пассивной иммунизации против RSV препаратом «Бейфортус» (Beyfortus)

RSV, респираторно-синцитиальный вирус, является широко распространенным вирусом дыхательных путей. Как правило, инфекция RSV вызывает лишь слабые симптомы, похожие на обычную простуду. Однако, особенно у младенцев, восприимчивых детей и пожилых людей, инфекция RSV может вызвать серьезные заболевания, включая бронхолит (воспаление мелких дыхательных путей в легких) и пневмонию, что может привести к госпитализации или даже смерти. У детей инфекция RSV является наиболее частой причиной госпитализации в зимние месяцы. Обычно вирус встречается в период с октября по март. В качестве защиты от RSV для новорожденных, младенцев и детей младшего возраста предлагается препарат «Бейфортус».

Что представляет собой «Бейфортус» (действующее вещество нирсевимаб)?

В отличие от вакцинации (активной иммунизации), при которой антитела сначала должны быть выработаны иммунной системой, с «Бейфортусом» вводятся готовые антитела (пассивная иммунизация). Эти антитела связываются с определенными участками вируса и не дают ему проникнуть в клетки человека и вызвать тем самым симптомы заболевания.

Кому следует проводить пассивную иммунизацию?

Согласно австрийскому плану иммунизации, пассивная иммунизация обычно рекомендуется новорожденным, младенцам и детям младшего возраста в первый сезон RSV и особенно детям из группы риска в возрасте до 24 месяцев, которые сохраняют восприимчивость к тяжелому заболеванию RSV во второй сезон RSV.

Когда следует проводить пассивную иммунизацию?

Дети, родившиеся во время сезона RSV с 1 октября по 31 марта, должны получить иммунизацию в течение первой недели жизни до выписки из больницы. Дети, родившиеся вне сезона RSV в период с 1 апреля по 30 сентября, должны получить иммунизацию до первого сезона RSV в регионе проживания.

Как проводится пассивная иммунизация?

«Бейфортус» вводится в виде однократной инъекции в мышцу. Инъекция обычно производится в наружную область бедра.

Связана ли пассивная иммунизация с расходами?

Нет. Она предоставляется бесплатно в рамках программы бесплатной вакцинации детей федерального правительства, федеральных земель и социального страхования.

Кому не следует проводить пассивную иммунизацию?

Пассивная иммунизация не должна применяться, если у вашего ребенка есть аллергия на нирсевимаб или любой другой компонент препарата (см. также инструкцию по применению). Обсудите с вашим врачом, можно ли вашему ребенку назначать «Бейфортус».

Какие возможны побочные эффекты?

Как и все лекарства, этот препарат может вызывать побочные эффекты, но они возникают не у всех. Среди возможных побочных эффектов (могут наблюдаться у 1 из 100 пациентов) могут быть:

- кожная сыпь (0,7 %) в течение 14 дней после применения;
- реакция в месте инъекции (0,6 %), такая как покраснение, отек и боль;
- повышение температуры (0,4 %).

Этот информационный листок не заменяет инструкцию по применению и консультацию. Если у вас возникли дополнительные вопросы по поводу этого препарата, обратитесь к вашему лечащему врачу!