

# ورقة معلومات التحصين السلبي ضد الفيروس المخلوي التنفسي باستخدام عقار Beyfortus

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس منتشر بشدة يصيب الجهاز التنفسي. تسبب عدوى الفيروس المخلوي التنفسي عادةً أعراضًا خفيفة فقط، تشبه نزلات البرد. ومع ذلك، يمكن أن تسبب عدوى الفيروس المخلوي التنفسي تحول الحالة المرضية إلى خطيرة، ولا سيما عند الرضع والأطفال الضعفاء وكبار السن، بما في ذلك التهاب القصبيات (التهاب مجرى التنفس الصغير في الرئتين) والالتهاب الرئوي، ومن ثم، دخول المستشفى أو حتى الوفاة. تُعدُّ عدوى الفيروس المخلوي التنفسي السبب الأكثر شيوعًا وراء دخول الأطفال المستشفى في فصل الشتاء. ينتشر الفيروس عادةً في الفترة من أكتوبر إلى مارس. يتوفر عقار Beyfortus للوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لحديثي الولادة والرضع والأطفال الصغار.

## ما هو عقار Beyfortus (مكوّن Nirsevimab)؟

يقوم عقار Beyfortus بإدارة الأجسام المضادة الجاهزة (التحصين السلبي) وذلك على عكس التطعيم (التحصين النشط)، حيث يجب أن يتم إنتاج الأجسام المضادة أولاً عن طريق الجهاز المناعي. ترتبط هذه الأجسام المضادة بأجزاء معينة في الفيروس وتمنعه من اختراق الخلايا البشرية ومن ثم، التسبب في ظهور أعراض المرض.

## من الذي يجب أن يتلقّى التحصين السلبي؟

استنادًا إلى ما تنص عليه خطة التطعيم في النمسا، يوصى عمومًا بالتحصين السلبي لحديثي الولادة والرضع والأطفال الصغار خلال موسم تفشي الفيروس المخلوي التنفسي الأول، ولا سيما الأطفال المعرضين لمخاطر عالية حتى عمر 24 شهرًا والذين يظلون عرضة للإصابة بمرض الفيروس المخلوي التنفسي الشديد خلال موسم تفشي الفيروس المخلوي التنفسي الثاني.

## متى يجب تناول التحصين السلبي؟

يجب أن يتلقّى الأطفال المولودون خلال موسم تفشي الفيروس المخلوي التنفسي في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 مارس التطعيم خلال الأسبوع الأول من الولادة قبل الخروج من المستشفى. يجب أن يتلقّى الأطفال المولودون بعد موسم تفشي الفيروس المخلوي التنفسي في الفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر التطعيم قبل موسم تفشي الفيروس المخلوي التنفسي الأول في المراكز الطبية المسجلة.

## كيف يتم إعطاء جرعات التحصين السلبي؟

يُعطى عقار Beyfortus كحقنة لمرة واحدة في العضل. يتم الحقن عادةً في المنطقة الخارجية للفخذ.

**هل يتم دفع أي أموال مقابل الحصول على جرعات التحصين السلبي؟**  
لا. يتوفر العقار مجانًا كجزء من برنامج تطعيم الأطفال المجاني للحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية والضمان الاجتماعي.

**هل هناك أشخاص يحظر إعطائهم جرعات التحصين السلبي؟**  
يحظر إعطاء جرعات التحصين السلبي إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه Nirsevimab أو أي من مكونات الدواء الأخرى (انظر تعليمات الاستخدام). يُرجى التحدث مع طبيبك عما إذا كان من الممكن أن يتناول طفلك عقار Beyfortus أم لا.

**ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟**  
يمكن أن يسبب هذا الدواء شأنه شأن أي دواء آخر آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تظهر على الجميع. قد تشمل الآثار الجانبية غير الشائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 100 شخص):

- طفح جلدي (0.7%) خلال 14 يومًا من الاستخدام
- تفاعل في مكان الحقن (0.6%) مثل الاحمرار والتورم والألم
- الحمى (0.4%)

لا يمكن أن تحل ورقة المعلومات هذه محل أي تعليمات للاستخدام أو مناقشة توضيحية. إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول هذا الدواء، فيُرجى الاتصال بطبيبك!