

# Informativni list za pasivnu imunizaciju protiv RSV-a sa lijekom Beyfortus

RSV, respiratorni sincicijski virus, uobičajen je respiratorni virus. U pravilu RSV infekcija uzrokuje samo blage simptome, slične obične prehlade. Posebno kod dojenčadi, kod osjetljive djece i starijih odraslih osoba, infekcija RSV-om može da prouzrokuje ozbiljne bolesti, uključujući bronhiolitis (upala malih disajnih puteva u plućima) i upalu pluća, što može dovesti do hospitalizacije ili čak smrti. Kod djece RSV infekcija je najčešći razlog hospitalizacije u zimskim mjesecima. Virus se obično pojavljuje između oktobra i marta. Za zaštitu od RSV-a za novorođenčad, dojenčad i malu djecu dostupan je lijek Beyfortus.

## Šta je Beyfortus (sastojak Nirsevimab)?

Za razliku od vakcinacije (aktivne imunizacije), u kojoj antitijela prvo mora da proizvede imuni sistem, Beyfortus primjenjuje gotova antitijela (pasivna imunizacija). Ova antitijela se vežu za određene dijelove virusa i sprječavaju virus da uđe u ljudske stanice i na taj način uzrokuje simptome bolesti.

## Ko treba da primi pasivnu imunizaciju?

Prema austrijskom planu vakcinacije, pasivna imunizacija se općenito preporučuje za novorođenčad, dojenčad i malu djecu tokom njihove prve sezone RSV-a, a posebno za djecu sa visokim rizikom do 24 mjeseca starosti koja ostaju podložna teškom RSV-u tokom druge sezone RSV-a.

## Kada treba da se izvrši pasivna imunizacija?

Djeca rođena u toku sezone RSV-a između 1. oktobra i 31. marta trebaju da prime imunizaciju unutar prvog tjedna života prije otpuštanja iz bolnice. Djeca rođena izvan sezone RSV-a između 1. aprila i 30. septembra treba da prime imunizaciju prije prve sezone RSV-a putem lokalnih registriranih doktora za vakcinaciju.

## Kako se provodi pasivna imunizacija?

Beyfortus se daje kao jedna injekcija u mišić. Injekcija se obično daje na vanjsku stranu butine.

**Da li je pasivna imunizacija povezana sa troškovima?**

Ne. Dostupan je besplatno kao dio besplatnog programa vakcinacije djece koji vode savezna vlada, savezne države i socijalno osiguranje.

**Da li postoje osobe koje ne bi trebale da prime pasivnu imunizaciju?**

Pasivna imunizacija ne bi trebalo da se obavlja ako je Vaše dijete alergično na nirsevimab ili neki drugi sastojak lijeka (pogledajte informacije za korištenje). Razgovarajte sa svojim doktorom da li vaše dijete smije da primi Beyfortus ili ne.

**Koje su nuspojave moguće?**

Kao i svi lijekovi, i ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se ne moraju pojaviti kod svih.

Manje česte nuspojave (mogu se pojaviti kod 1 do 100 osoba) i vidljive su kao:

- osip (0,7%) unutar 14 dana nakon primjene
- reakcija na mjestu uboda (0,6%), kao što su npr. crvenilo, otok i bol
- povišena temperatura (0,4 %)

Ovaj informativni list ne može zamijeniti Informacije za korišćenje ili informativni razgovor. Ako imate dodatnih pitanja o ovom lijeku, obratite se svom doktoru!