

Fișă de informare privind imunizarea pasivă împotriva VSR cu Beyfortus

VSR, virusul sincițial respirator, este un virus foarte răspândit al căilor respiratorii. Infecția cu VSR provoacă de obicei doar simptome ușoare, similare unei răceli obișnuite. Cu toate acestea, în special la sugari, copiii cu sensibilitate și adulții mai în vârstă, infecția cu VSR poate provoca afecțiuni severe, inclusiv bronșiolită (inflamarea căilor respiratorii mici din plămâni) și pneumonie, necesitând spitalizare și existând chiar riscul de deces. La copii, infecția cu VSR este cel mai frecvent motiv de spitalizare în lunile de iarnă. Virusul este întâlnit preponderent în perioada octombrie - martie. Beyfortus este disponibil ca metodă de protecție împotriva infecției cu VSR pentru nou-născuți, sugari și copiii mici.

Ce este Beyfortus (substanța activă nirsevimab)?

Spre deosebire de vaccinare (imunizare activă), ce presupune că anticorpul trebuie mai întâi produs de sistemul imunitar, prin tratamentul cu Beyfortus organismului i se administrează anticorpi gata preparați (imunizare pasivă). Acești anticorpi se leagă de anumite zone specifice ale virusului, împiedicându-l să pătrundă în celulele umane și, implicit, să declanșeze simptome de boală.

Pentru cine se recomandă tratamentul de imunizare pasivă?

Conform programului de vaccinare din Austria, imunizarea pasivă se recomandă în general pentru nou-născuți, sugari și copiii mici în timpul primului lor sezon VSR, și în mod special pentru copiii cu risc în vârstă de până la 24 de luni, care rămân predispuși la manifestări severe ale infecției în timpul celui de-al doilea lor sezon de expunere la VSR.

Când ar trebui efectuată imunizarea pasivă?

Pentru copiii născuți în timpul sezonului VSR între 1 octombrie și 31 martie, se recomandă ca imunizarea să fie efectuată în prima săptămână de viață, înainte de externarea din spital. Copiii născuți în afara sezonului VSR, între 1 aprilie și 30 septembrie, ar trebui să primească tratamentul de imunizare într-un cabinet local înainte de debutul primului lor sezon VSR.

Cum se administrează imunizarea pasivă?

Beyfortus se administrează ca o singură injecție intramusculară. Injecția se face de obicei în zona exterioară a coapsei.

Imunizarea pasivă implică costuri?

Nu. Este disponibilă gratuit în cadrul programului de vaccinare gratuită a copiilor derulat de guvernul federal, statele federale și serviciul de asigurări sociale.

Există persoane care nu ar trebui să primească tratamentul de imunizare pasivă?

Imunizarea pasivă nu trebuie administrată în cazul în care copilul dumneavoastră este alergic la nirsevimab sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (a se vedea și prospectul). Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră dacă copilului dumneavoastră i se poate administra Beyfortus sau nu.

Ce reacții adverse sunt posibile?

Ca toate medicamentele, și acesta poate provoca reacții adverse, dar acestea nu apar la toate persoanele. Reacțiile adverse ocazionale (pot apărea la până la 1 din 100 de persoane tratate) includ :

- erupție cutanată (0,7%) în decurs 14 zile de la administrare
- reacție la locul de injectare (0,6%), cum ar fi de ex. roșeață, umflare și durere
- febră (0,4%)

Această fișă informativă nu poate înlocui prospectul de utilizare sau o discuție de informare. Dacă aveți întrebări suplimentare despre acest medicament, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră curant!